


# Flubenzulac<sup>®</sup> / 25 WP



INSECTICIDA NO SISTÉMICO  
DE LARGA PERSISTENCIA QUE ACTÚA  
POR CONTACTO E INGESTIÓN



500g 1kg

Ingrediente activo: **Diflubenzuron 250 g/kg**  
Formulación: **Polvo Mojable (WP)**



# Flubenzulac<sup>®</sup> / 25 WP

Interrumpe el ciclo biológico del insecto, actúa sobre los estadios inmaduros del insecto sin afectar a los individuos adultos.

Acción ovicida por contacto, inhibe el desarrollo de la larva en el huevo.

Actividad larvicida por ingestión, inhibe la síntesis de quitina, bloquea el proceso normal de muda provocando la muerte de las larvas.

No genera resistencia ni contamina el ambiente. No afecta abejas ni otros polinizadores. El IA no penetra en los tejidos de la hoja por eso no afecta a los insectos chupadores.

No tiene efecto de choque.

Cultivo	MAIZ
Plaga	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )
Aplicación	Se recomiendan tratamientos cuando se observen las primeras larvas. Aplicar en hojas y frutos. Se recomienda 1 aplicación por campaña
Dosis	0,1125 kg/Ha
P.C.	5 días
P.R.	24 h
LMR	0,2 ppm



P.C.: Periodo de carencia  
P.R.: Periodo de reentrada



En caso de intoxicación comuníquese con el centro de emergencias ESSALUD: 0801-10200 o 411-8000 opción 4 (línea gratuita), con CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito), o con AGROLAC ANDINA SAC: 261-5227

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Advertencia: ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para guardar alimentos o agua para consumo.

Entréguese envases vacíos con triple lavado en los puntos AGROVERDE.

**Agrolac**  
ANDINA

AGROLAC ANDINA SAC  
Jirón Sáenz Peña, Dpto. 105  
Magdalena del Mar, Lima (PERÚ)  
Tel: +51 1 261 5227  
info@agrolac.com · www.agrolac.com