


Grolac[®] / 75 WP



FUNGICIDA NO SISTÉMICO
DE CONTACTO PARA EL CONTROL
DE ENFERMEDADES FOLIARES



500g 25kg

Ingrediente activo: **Clorothalonil 750 g/kg**
Formulación: **Polvo Mojable (WP)**



Agrolac
ANDINA

Grolac® 75 WP

Fungicida preventivo y curativo de amplio espectro. Se puede aplicar antes que la enfermedad llegue a niveles altos de infestación.

Acción fungicida por inhibición de la respiración celular.

Impide la germinación de esporas y la motilidad de las zoosporas. Es tóxico para las membranas celulares de los hongos fitopatógenos.

Tiene una baja capacidad de translocación local que favorece la erradicación de numerosas enfermedades de origen fúngico.

Cultivo	CEBOLLA
Plaga	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)
Aplicación	Aplicación foliar. Hacer las aplicaciones necesarias de acuerdo el grado de infestación presente en el cultivo. Evitar la aplicación en presencia de viento.
Dosis	2,3 L/Ha
P.C.	5 días
P.R.	24 h



P.C.: Periodo de carencia
P.R.: Periodo de reentrada

RECOMENDADO SU USO PARA LOS SIGUIENTES CULTIVOS

PAPA	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)
TOMATE	Antracnosis del tomate (<i>Colletotrichum phlomoides</i>) Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)
FRÍJOL	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)
BANANO	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i> Morelet)

En caso de intoxicación comuníquese con CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 (fuera de Bogotá) o en Bogotá el teléfono (091) 2886012. Atención 24 horas.

Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto.

Advertencia: ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para guardar alimentos o agua para consumo.

Entréguese envases vacíos con triple lavado en los puntos BIOECO.

Agrolac
ANDINA

AGROLAC ANDINA S.A.S
Calle 95 N 15-47, Oficina 703
Bogotá (COLOMBIA)
Tel.: +57 1 2573340

info@agrolac.com · www.agrolac.com

